



07/05/2022

המלצות להדברת אקרית הקורים של פרי התמר - *Oligonychus afrasiaticus*



תיאור המזיק:

האקרית קטנה, בעלת רגליים קצרות, אורכה 0.3 מ"מ, צבעה שקוף – צהוב. טווח קורים רבים. הטלת הביצים נעשית על גבי הקורים בנקודת המגע של פירות וכן בין הפרי לסנסן.

נזק:

האקרית נמצאת במטע כל השנה, מתרבה במידה רבה עד כדי גרימת נזק בשלב פיזיולוגי מסוים של גדילת הפירות. בזנים ברהי ומג'הול אקרית הקורים מופיעה בין אמצע - לסוף מאי ובדקל נור היא מופיעה חודש מאוחר יותר בין אמצע - לסוף יוני. הנזק נגרם בגלל מציצה וגירוד בפרי הירוק הגורמים לייבוש והתבקעות הקליפה. היא עוזבת את הפרי בשלב החלפת צבע מלאה. אקרית הקורים של פרי התמר מצויה כיום בכל מטעי הערבה.

הדברה:

בזנים מג'הול וברהי מרססים את האשכולות בלבד עם ההופעה של האקרית בין אמצע – לסוף מאי. בדקל נור כחודש מאוחר יותר בין אמצע – לסוף יוני. בשלב זה האשכולות עדיין לא סגורים וחשוב שהתכשיר יגיע לכל הפירות באשכול.

- עץ מג'הול צעיר פורח מוקדם יותר ממבוגר ולכן ירוסס ראשון.
- ריסוס יעיל בזמן המתאים מספיק לכל העונה ללא נזק לפירות.

תכשירי ההדברה

ורטימק, אגרירון, ביומקטין, ורקוטל במינון 0.1% בשילוב שמן אולטרא פיין במינון 1%-0.5%.

במטעים אורגניים מטפלים עם גפרביק 70 אבקה לגיפור.

גיפור ראשון בתכשיר גופרביק 70 יינתן לכל עצי המטע כמתואר לעיל, ללא צורך בניטור מוקדם.

טיפול נוספים יינתנו על פי הניטור.

בברכה,
סבטלנה דוברינין
מדריכת הגנת הצומח

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי. על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד.

אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של החתום.