



17/10/19

המלצות להדברת מחלת הכימשון בעגבנייה

למגדלי העגבניות בערבה וכיכר סדום,

לאחר הגשם ועקב טמפרטורות מתאימות ישנו סיכוי להתפתחות מחלת הכימשון בגידול העגבנייה בשטח פתוח ובבתי רשת.

התנאים להתפתחות המחלה: טווח טמפ' 15-29 מ"צ ולחות 90% ומעלה למשך 10 שעות לפחות, או 15-25 מ"צ למשך שעות אחדות בנוכחות מים חופשיים על פני הצמח.

על מנת להגן על הצמחים ולעצור מחלה הקיימת, כדאי לבצע לפחות טיפול אחד למניעה. במקרה והמחלה כבר החלה להתפתח מומלץ לבצע שני טיפולים להדברה (בהפרש של שבוע) באחד התכשירים המורשים על ידי חברת השיווק. יש לשים לב לימי המתנה לקטיף.

תכשירים למניעת המחלה: אנטרקול, אורבגו, בנג'ו פורטה, בראבו ודומיו, מנצידן ודומיו, קליפמן, קוציד, נימטול (בשילוב עם קוצייד), אקרובט, קאבריו, אתלט ודומיו, מרק בורדו/נחושתן, ספינקס סופרא/ברקוד, קופרופיקס, קריאל MZ/רבוס, ולבון, רוקסם

תכשירים להדברה: דותן, מנקור ודומיו, ויטן ודומיו, זטניל, קומודור.

תכשירים למניעה והדברה: אינפיניטו, סנדומיל ודומיו, רידומיל גולד MZ, רודאו MZ, פוליו גולד/מטאל גולד, גולבן מנקוזב.

כדי לקבל יעילות גבוהה יותר מומלץ לשלב את התכשירים הבאים:
פוליו גולד + קורזיט

אקרובט + ויטן

אקרובט + רידומיל גולד MZ

ויטן + מנקו די

קריאל + קורזיט

בברכה,

סבטלנה דוברינין

מדריכת הגנת הצומח

טלפון לבירור וייעוץ נוסף: 050-6241632

כל האמור כאיל הינו בעצם עצה מקצועית באמצעות אמצעי התקשורת הנ"ל



בקרי באגרי שה"מ:

<http://www.shaham.moag.gov.il>

חוות גילת 85820 . טל' 9920982 – 08 פקס 9920970 - 08