

הגנת הצומח בדלועיים יום עיון לחקלאי הערבה

עין יהב 29/1/09

תחנת זוהר 11/2/09

סבטלנה דוברינין

מדריכת הגנת הצומח, שה"מ

דקוס הדלועיים-מזיק הסגר

Dacus ciliatus Loew: Tephritidae

מזיק הסגר לאירופה, ארצות הברית ויפן



□ נתגלה ב- 1992

□ תוקף כל מיני דלועיים

□ נפוץ בארצות אפריקה כולל מצריים,

ערב הסעודית, תימן, עיראק, איי



האוקיינוס ההודי ותת היבשת ההודית

□ תפוצתו בישראל: הערבה, איזור ים המלח, מדבר יהודה, עמק

הירדן התחתון, הנגב הצפוני ומישור החוף הדרומי

מתזור חיים

2-4 ימים



רימה


7-12 יום



14-28 יום




60-180 יום



7-14 יום

גולם



ביצים



רימה

אורך: 9-10.5 מ"מ



נזק

**הידיעה על הימצאותו בישראל עלולה
לסגור שווקי יצוא קיימים ועתידיים**



ריקבון החנטים





מניעה והדברת המזיק

ריסוס מתחילת החנטה בתדירות - פעם ב- 2-3 שבועות:



- מוספילן

- טלסטאר

בנוכחות המזיק:

להוריד את כל הפירות הנגועים

לרסס את השטח