



14.03.10

המלצות להדברת מחלת קימחון במנגו ערבה 2010

מומלץ לרסס 2-3 ריסוסים בהופעת המחלה בתדירות אחת ל- 7-10 ימים. הריסוס יעשה לכיסוי התפרחות. מועד האחרון לריסוס: כאשר החנטים מגיעים לגודל זית. תכשירי הדברה לטיפול: בהתאם לחברת היצוא.

אופיר, אאופרן מולטי, שמן EOS, טופנקו/עומר, אטמי אקסטרה, אינדר, באילטון, באיפידן/שביט, בלקיוט, גופרביק, גופרטיב, קומולוס, דומארק, דומארק קומבי, מרית, סטרובי, סיסטאן, ספרול, פלינט, קוליס, קרטון, קרמט, רוביגן, שריף, זהר 215 LQ, טימור, טימורקס, סרנייד.

- יש לקרוא את התווית שעל אריזת התכשיר לפני הטיפול ולפעול בהתאם.
- יש לטפל לחילופין בתכשירי ההדברה בעל מנגנון פעולה שונה בכדי למנוע התפתחות עמידות על ידי הפגע.

בברכה,

סבטלנה דוברינין	ברוך לוזון
מדריכת הגה"צ	מדריך מטעים

“כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות”



ד"ר באר שר"א

<http://www.shaham.moag.gov.il>

חוות גילת 85820 . טל' 9920982 – 08 פקס 9920970 - 08