



29.10.15

המלצות למגדלי עגבניות בנושא וירוס המוזאיקה של העגבנייה (ToMV)

מבוא - דרכי העברת הנגיף (ווירוס)

הווירוס מועבר באמצעות זרעים, הרכבות צמחים, שתילת צמחים בריאים לקרקע נגועה ללא תוך חוצץ מהשנה הקודמת. הווירוס מועבר במגע בידיים או בכלי עבודה במהלך עבודות אגרוטכניות או בביקורים בשדה. שאריות צמחים (אפילו יבשים) או ספיחים נגועים משמשים כעשבייה פונדקאית בשדה ובסמוך לחלקות ועלולים להוות מקור הדבקה.

המלצות

- יש להימנע מהכנסת עגבניות קנויות לשטחי גידול או לידם במהלך העבודות או הביקורים בה. הנוזל שנשאר על הידיים מהפירות יכול לגרום להדבקת הצמחים בוירוס. הזרע שנפל בחלקה או לידה יכול לגדול ולהוות מקור מידבק לשדה נקי.
- יש לנקות ולחטא ארגזי קטיף לפני הכנסתם לחלקה.
- ניוד עובדים יעשה מחלקות צעירות ונקיות (שהנגיעות בהן נמוכה) לחלקות בוגרות (נגיעות גבוהה בנגיף) ולא להיפך. עם תום העבודה בחלקה נגועה על העובדים להחליף את בגדי העבודה ולכבסם, לנקות ביסודיות ולחטא את נעלי העבודה. ניתן להשתמש בחלוקים וערדליים חד-פעמיים והחלפתם בסוף העבודות בחלקה. שימוש בכפפות חד-פעמיות, החלפתן או טבילתן ב- 0.3% אקונומיקה, 10% TSP או 1000 ppm קלורבק (5 גרם לליטר מים) בתדירות גבוהה.
- יש לחטא כלי העבודה (סכינים ומזמרות) ע"י טבילתם באקונומיקה לעיתים תכופות במהלך הפעולות האגרוטכניות. מומלץ! להשאיר את כלי עבודה ששימשו לעבודה במבנה הנגוע אותו המבנה ולא להעבירם לחלקות צעירות/נקיות מהנגיף.
- הנגיף מסוגל להדביק את צמחי הפלפל, מומלץ לשמור על סניטציה גם לפני כניסתכם לשדות פלפל.
- מומלץ לבצע טיפולים להדברת עשבים.

בברכה,
סבטלנה דוברינין
מדריכת הגנת הצומח

"כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות"



ד"ר זאב ש"א:

<http://www.shaham.moag.gov.il>

חוות גילת 85820 . טל' 9920982 – 08 פקס 9920970 - 08