



19.11.2015

למגדלי הפלפל

מבזק הגנת הצומח בפלפל בערבה

הפחתת אוכלוסיית כנימת עש הטבק

בזמן האחרון בשטח הפלפל עלתה רמת כנימת עש הטבק באופן משמעותי. הנזק הנגרם עקב עליית האוכלוסייה יכול להיות ישיר המתבטא בהחלשה והצהבת הצמח והבהרה בצבע הפירות. נזק עקיף מתבטא בהופעת פטריות "פייחת" המתיישבות על הפרשות מתוקות של כנימות עש הטבק. ה"פייחת" בהמשך מאוד קשה לטיפול והפרי לא ראוי לשווק. אין צורך להוריד את אוכלוסיית כנימת עש הטבק לרמות אפס, אלא כדאי להפחיתה. להלן תכשירי הדברה להפחתת אוכלוסיית המזיק בהתאם לממשק הדברה הקיים בשטחים:

1. ממשק הדברה משולבת:

- a. חבילת אויבים טבעיים מלאה - התכשיר אפלורד מדביר דרגות צעירות וניתן להבחין בתוצאות ההדברה כבר כ-8-10 ימים לאחר ריסוס, וכחודש מהטיפול ניתן להבחין בירידת אוכלוסיית הבוגרים. מטרונום/רקוויאם - תכשיר פועל במגע וגורם לייבוש חרקים רגישים, כדאי לבצע 2-3 טיפולים בהפרש של כחמישה ימים ולרסס בשעות אחר הצהריים וערב. זהר 215LQ עם נימיקס 45 - השילוב מדביר את דרגות הזחל וכדאי לבצע 2-3 טיפולים בהפרש 7 ימים. עזגן - תכשיר סיסטמי (לפי הגדרת החברה) מונע אכילה ופועל על מנגנוני הרבייה להקטנת האוכלוסייה. **לשים לב! שילוב של עזגן עם תותח או ברקן - פוגע באויבים טבעיים.**
- b. חבילות ללא אקרית טורפת פרסימיליס - כל התכשירים שהוזכרו למלה. תכשיר אוברון - קוטל את כל הדרגות ביצים זחלים של כנימת עש הטבק.

2. בהדברה כימית ללא אויבים טבעיים - מומלץ לעיין ברשימת תכשירי הדברה של חברת השיווק שלכם.

טיפול למניעת הופעת מחלת העובש האפור (בוטריטיס)

1. עדיין אין תנאים מיטביים להתפתחות מחלת העובש האפור (בוטריטיס), אך כבר הגיע זמן לטיפולים למניעתה, במיוחד במושבים כמו פארן וצופר, שהטמפרטורות בהם כבר ירדו ל 20-24⁰ בממוצע. כדאי להתחיל עם תכשירים למניעה ובחודשים דצמבר וינואר להמשיך עם תכשירים להדברה.
2. תכשירים למניעת המחלה - פולאר בתוספת עם ביופילם, סיגנום/בליס, רובראל/רודיון, סרנייד .ASO



בקי באגר שלי:

<http://www.shaham.moag.gov.il>

חוות גילת 85820. טל' 9920982 - 08 פקס 9920970 - 08
סבטלנה 050-6214632 svetyd@gmail.com



3. תכשירים להדברת המחלה – טלדור, סיגנום/בליס, סוויץ/סאוונה/טאץ', פרופיקה, רובראל/רודיון. לשים לב, יש היום גזעים עמידים של פטרית בוטריטיס לתכשיר רובראל.
4. חשוב! כל התכשירים המיועדים למניעה או הדברת המחלה ניתנים אך ורק **בריסוס**. לכך יש מספר סיבות: להגן על הצמח חיצונית מפני הפטרייה, לשמור על הפירות מפני ההדבקה גם בשדה, אך חשוב יותר בהובלה ואחסון ולמנוע פיתוח עמידות של הפטרייה לתכשירי הדברה הקיימים בארסנל.

התמוטטות חורפית של צמחי הפלפל

המחלה נגרמת על ידי פטריית פיתום שתוקפת את צמחי הפלפל בחורף בטמפרטורות נמוכות מתחת ל 8°C . מומלץ לייצב את ממשק השקיה (כדאי לפנות למדריך גידול) בהתאם לצרכי הצמח וסוג הקרקע. יש לשקול מתן הטיפול בשטחים עם היסטורית המחלה עם הגעת הטמפרטורה ל $10-12^{\circ}\text{C}$. לטיפול יש להתייעץ עם מדריכת הגנת הצומח.

לפני כל טיפול יש לעיין בתווית התכשירים וברשימת תכשירי הדברה של חברת השיווק וימי המתנה לקטיפה.

בברכה,
סבטלנה דוברינין,
מדריכת הגנת הצומח

"כל האמור לעיל הינו באדר עצה מקצועית בלבד וצף מקבל הצעה לנהוג מנהל להירות"

