



24.07.2015

המלצות הגנת הצומח בתחילת העונה בפלפל ליצוא

ערבה וכיכר סדום, 2015-2016

חשוב!

1. על החקלאי לשים לב להרשאות ולתנאי השימוש בתכשיר ההדברה המפורטים בתווית ולהתנהל על פיהם בלבד. המועד האחרון לקטיף, הרשום בתווית התכשיר הוא לשוק מקומי ואינו בהכרח גם ליצוא. רשימה מעודכנת של תכשירי ההדברה המותרים לשימוש ליצוא תינתן לחקלאי על ידי החברה דרכן הוא מייצא. ברשימה זו יפורטו גם ימי המתנה לפני קטיף.
2. חקלאים המשתמשים בדבורים להאבקה (בומבוס או דבורי דבש) או משתמשים אויבים טבעיים בהדברה משולבת, חייבים לפעול לפי הוראות ספקי הדבורים והאויבים הטבעיים.
3. ככלל, יש לטפל לחילופין בתכשירי הדברה ממשפחות כימיות שונות כדי למנוע בניית עמידות של הפגעים.
4. הזהרו! אין לרסס צמחים צמאים או הנמצאים בעקה בעקבות הסרת רשת הצל.
5. אסור להשאיר תכשיר במים במרסס מעבר למספר שעות בודדות, אלא אם מצוין אחרת בתווית התכשיר.

הדברה

1. בקבלת השתילים מהמשתלה מומלץ לשתול מיד. במידה ולא שותלים מיד, חייבים להגן על השתילים מפני מזיקים (כנימת עש הטבק, אקרית אדומה, תריפסים, זחלים ועוד) הנמצאים בסביבתם.
 2. שתילים שקיבלו טיפול במשתלה בסמוך לשליחתם אל המגדל אין צורך לרסס שוב את המגשים. מומלץ לתת טיפול בתכשיר אבמקטיין (ורטימק ודומיו) נגד אקרית אדומה, אקרית עיוותים ותריפסים מספר ימים לאחר השתילה או לפי ההמלצות של פקח מזיקים.
 3. טיפול מומלץ נגד זחלים של עשי לילה, אקרית עיוותים, תריפסים הוא בפרוקליים/פרפקט/נוקאאוט במינון של 40 סמ"ק לדונם.
- אם אין שיבוש במזיקים (כגון אקריות אדומות, זחלים ותריפסים) אין צורך להשתמש בתחילת העונה בשילוב פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט + תכשירי אבמקטיין. אפשר להשתמש רק באחד מהם ולרסס אותם לחילופין מדי 10-14 ימים.



4. מומלץ להגמיע תכשירי אימידקלופריד (קונפידור ודומיו) 10-14 יום לאחר השתילה, להדברת כנימות **עלה** ומניעת נזקי הווירוסים המועברים על ידיהן. תכשירי אימידקלופריד יינתנו במינון **50 - 40** סמ"ק לדונם לפי התווית (**שימו לב! זה המינון המותר בפלפל**). וזה המינון היעיל נגד כנימות עלה ואין צורך להעלות אותו. בעקבות ההחלטה של איחוד האירופי להגביל את השימוש בתכשירי אימידקלופריד, יש לוודא עם חברת היצוא את תנאי השימוש בתכשיר.
5. **מחלת פיתיום (מקמקת)** הנגרמת על ידי פטריית הפיתיום יכולה לתקוף את השתילים הצעירים מיד לאחר השתילה.
- לא מומלץ לטבול את מגשי השתילים בשום תכשיר הדברה (דינון וכדומה) כדי להימנע מתופעות לא רצויות.
- שטח שלא עבר חיטוי קרקע או שטח עם היסטוריה של מחלת פיתיום, מומלץ לטפל מיד לאחר השתילה ע"י הגמעת תכשיר רידומיל גולד נוזלי במינון 40 סמ"ק/ד' עם ההשקיה הראשונה או שניה לאחר השתילה.
6. **נמטודות (נימיות)**: טיפול בנימית העפצים ונימית הפציעה (פרטילנכוס) לאחר השתילה: ניתן להשתמש בתכשירי הדברה הבאים במהלך הגידול: וידט/ויוה, ביונס, ביוסף.
- לשים לב! תכשיר הדברה וידט/ויוה פוגע באויבים טבעיים ולפני היישום יש להתייעץ עם פקח מזיקים שלכם.**

על כל פגע או תופעה לא מוכרים, רצוי ומומלץ לעדכן מידי את צוות הפקחים והמדריכים.

בהצלחה,

סבטלנה דוברינין,

מדריכת הגנת הצומח

כל האמור לעיל הינו בשם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואל מקבל אחריות מנהל לפרטים