



הגנת הצומח בכרם ערבה 2016

סבטלנה דוברינין


מדריכת הגנת הצומח בערבה

שה"מ, משרד החקלאות



מחלת קימחון

- נגרמת על ידי הפטרייה *Uncinula necator*
- פרזיט מוחלט
- הפטרייה תוקפת אך ורק גפן
- מחלות קימחון המופעיות בגידולים אחרים לא גורמות נזק לגפן
- פטרייה אקסוגנית- נמצאת על פני חלקי הצמח
- תוקפת את כל חלקי הצמח







ממשק הדברה

- מניעה: תדירות הטיפולים - פעם בשבועיים
- מתחילת הלבוב עד שלב הבוחל
- הדברה: תדירות הטיפולים – פעם בשבוע
- עד שלה הבוחל - מאותו שלב הקימחון לא יעלה על הפרי
- להשתמש בתכשירים מקבוצות כימיות שונות



כנימה קמחית הגפן

Planococcus ficus





White cottony ovisac (bark remove





ממשק הדברה

- לפי הניטור

לא להכחיד, אלא למנוע עליה על האשכולות

- תכשירי הדברה :

- הגמעה- קונפידור ודומיו, אקטרה

- ריסוס- אפלורד, מובנטו, דורסן ודומיו

- לא לרסס דורסן בצימוח צעיר עד אורך השריג

50 ס"מ






נמלים -

- הסעת הכנימות ממקום למקום והפצתן בבית הגידול



- הפרעה לאויבים טבעיים



- הדברה – דורסן אבקה, פנפוס לחקלאות



עשים נובר הגזע

- עשי למוריה וסטטמופודה
- מזיקים רק בערבה בחממות ובשדה פתוח
- נוברים בגזע
- נמשכים להפרשות של הגפן
- נמשכות לטל דבש- הפרשות של כנימות קמחיות



ממשק הדברה

- טיפול כימי לאחר בציר ועל פי הניטור
- תדירות הטיפולים פעם בחודש
- תכשיר הדברה: קרטה מקס, קורגן, אמפליגו





תריפס הפרחים המערבי

Frankliniella occidentalis





ממשק הדברה

- ניטור בזמן הפריחה


- טיפול בתכשירי הדברה : טרייסר אולטרה, ספרטה


סופר, מסורול, רופאסט.



התריפס הסורי \ אדום *Retithrips syriacus*

בניגוד לרוב התריפסים, הזחלים
והגלמים מתגודדים על פני
העלים, איטיים בתנועתם (פרומון
התקהלות, צבע אזהרה).





• יש צורך בטיפול רק בכרמים צעירים



זבוב התסיסה וחיפושית התסיסה



- הבוגרים עוברים בין הגרגרים הנמצאים בתהליך ריקבון לבין הגרגרים בריאים ומפיצים את גורמי הריקבון.
- טיפול בתכשירי הדברה לפי הפגע: דורסן ודומיו, טלסטאר ודומיו, טרייסר אולטרה, מוסטנג, ספרטה סופר, סימבוש ודומיו, קרטה



תודה על ההקמה

