



11.07.16

המלצות הגנת הצומח בתחילת העונה בפלפל ליצוא ערבה וכיכר סדום, 2016-2017

חשוב!

1. על החקלאי לשים לב להרשאות ולתנאי השימוש בחומר ההדברה המפורטים בתווית החומר (לגבי השיוק לשוק המקומי) ובנוסף לרשימת המעודכנת של תכשירי ההדברה המותרים לשימוש בארץ היעד (לגבי יצוא). רשימה זו תינתן לחקלאי על ידי החברות דרכן הוא מייצא. ברשימה זו יפורטו גם ימי המתנה לפני קטיף. המועד האחרון לקטיף, הרשום בתווית התכשיר הוא לשוק מקומי ואינו בהכרח גם ליצוא.
2. יש לטפל לחילופין בתכשירי הדברה ממשפחות כימיות שונות כדי למנוע בניית עמידות של הפגעים.
3. חקלאים המשתמשים בדבורים להאבקה (בומבוס או דבורי דבש) או הפועלים בהדברה משולבת עם אויבים טבעיים חייבים לפעול לפי הוראות ספקי הדבורים והאויבים הטבעיים.
4. אין לרסס צמחים צמאים או הנמצאים בעקה בעקבות הסרת רשת הצל.
5. אסור להשאיר תכשיר במים במרסס מעבר למספר שעות בודדות, אלא אם מצוין אחרת בתווית התכשיר.
6. בקבלת השתילים מהמשתלה מומלץ לשתול מיד. במידה ואין שותלים מיד חייבים להגן על השתילים מפני המזיקים (כנימת עש הטבק, אקרית אדומה, תריפסים) הנמצאים בסביבתם.

הדברה

1. שתילים שקיבלו טיפול במשתלה בסמוך לשליחתם אל המגדל אין צורך לרסס שוב על המגשים. מומלץ לתת טיפול בתכשיר אבמקטין (ורטימק ודומיו) נגד אקרית אדומה, אקרית עיוותים ותריפסים מספר ימים לאחר השתילה או לפי המלצות פקח המזיקים.
2. טיפול מומלץ נגד זחלים של עשי לילה, אקרית עיוותים, תריפסים הוא פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט במינון 40 סמ"ק לדונם.
- אם אין שיבוש במזיקים אין צורך להשתמש בתחילת העונה בשילוב פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט + תכשירי אבמקטין (ורטימק ודומיו). אפשר להשתמש רק באחד מהם ולרסס אותם לחילופין מדי 10-14 ימים.
3. להדברת כנימות עלה ומניעת נזקי הווירוסים המועברים על ידיהן מומלץ להגמיע תכשירי אימידקלופריד (קונפיזור ודומיו) 10-14 יום לאחר השתילה. תכשירי אימידקלופריד יינתנו במינון **40-50** סמ"ק לדונם, כמצוין בתווית. שימו לב! זהו המינון המותר בפלפל. המינון יעיל כנגד כנימות עלה ואין צורך להעלות אותו.
4. לאור החלטת האיחוד האירופי להגביל את השימוש בתכשירי אימידקלופריד יש לוודא עם חברת היצוא את תנאי השימוש בתכשיר.
5. מחלת פיתיוס (מקמקת) הנגרמת על ידי פטריית הפיתיוס יכולה לתקוף את השתילים הצעירים מיד לאחר השתילה. לא מומלץ לטבול את מגשי השתילים בשום תכשיר הדברה (דינון וכדומה) כדי להימנע מתופעות לא רצויות. בשטח שלא עבר שום חיטוי קרקע או שטח עם היסטורית המחלה מומלץ לבצע טיפול מיד לאחר השתילה. ניתן להגמיע תכשיר רידומיל גולד נוזלי במינון 40 סמ"ק/דונם עם ההשקיה הראשונה או השנייה לאחר השתילה.
6. נמטודות (נימיות): טיפול בנימית העפצים ונימית הפציעה (פרטילנכוס) לאחר השתילה: ניתן להשתמש בתכשירי הדברה הבאים במהלך הגידול: ויידט/ויוה, ביונס. ליישום יש לעיין בתווית התכשירים. לשים לב! תכשיר הדברה ויידט/ויוה פוגע באויבים טבעיים יש להתייעץ לפני היישום עם פקח המזיקים שלכם.

בהצלחה,
 סבטלנה דוברינין
 מדריכת הגנת הצומח

כל האמור לעיל הינו בטקסט מקצועי בלבד ולא מקבל אחריות אנוש אנוש אנוש