

12.03.14

למגדלי התמרים בערבה

ניטור והדברת עש התמר הקטן (*Batrachedra amydraula*)

על פי הממצאים של פיילוט "ניטור עש התמר הקטן", המתבצע בערבה דרומית ונתונים מהספרות לגבי קצב התפתחות גלגולי העש השונים, עולה שכשבועיים-שלושה מתחילת עלית לכידות הזכרים במלכודת הפרומון צפויה נוכחות של זחלי המזיק באשכולות.



נזק של עש התמר הקטן



זחל של עש התמר הקטן

בזק:

הזחל מכרסם וניזון מהפירות. לפני שהוא חודר לתוך הפרי, הזחל טווה קורים דקיקים ומדביק את הפרי לסנסן או לפרי סמוך. בפרי הנגוע אפשר לראות את חור הכניסה של הזחל במפגש שבין עלי הגביע לפרי, כמו גם את הגללים השחורים של הזחל. להשלמת התפתחות הזחל דרושים מספר פירות.

המלצות:

מומלץ החל משבוע הבא 16.03.14, להתחיל בניטור זחלי עש התמר הקטן באשכולות.

ההדברה תינתן בנוכחות הזחלים.

טרייסר אולטרה בריכוז 0.04-0.06%, אלסיסטין, תכשירי כלורפיריפוס (דורסן ודומיו), תכשירי בצילוס ומוליט. **בערבה יש עדיפות ליישום טרייסר אולטרה**, בגלל יעילותו הגבוהה ורעילות נמוכה לאדם ולסביבה.

במטעים אורגנים: **טרייסר אולטרה ותכשירי בצילוס (B.t)** - (רעלן של חיידק) - בקטוספיין, ביטיון, ביו טי

בברכה,
סבטלנה דוברינין
מדריכת הגנת הצומח



בקב באגר שהיא:

<http://www.shaham.moag.gov.il>

חוות גילת 85820 . טל' 9920982 – 08 פקס 9920970 - 08