

בחנת חיי מצף מוראיה בקיץ 2002

גבי צוברי, שלומית כרמי- מו"פ ערבה

ענפי קטיף ירוקים של מוראיה נקטפו בתחנת יאיר ב – 28.8.02 והוכנסו לתמיסות שונות (להלן הרשימה). הפרחים שהו בחדר קירור למשך 12 שעות בטמפ' 2-4 מעלות צלסיוס, לאחר מכן נארזו והוכנסו לשם הדמיית משלוח לחדר בטמפ' של 8-10 מעלות צלסיוס למשך 15 שעות. בסיום ההדמייה הועברו הפרחים לאגרטלים בחדר תצפית. לחלק מהענפים בוצע קיטום ראש לפני ההטענה בחומרים כדלהלן.

הטיפולים

- משפר 6, ללא קיטום
- משפר 6, עם קיטום
- TOG4 -0.3% , ללא קיטום
- TOG4 -0.3% , עם קיטום
- מים, ללא קיטום
- מים, עם קיטום

תוצאות

- הצימוח הצעיר נוטה לקמול מוקדם יותר, ובא לידי ביטוי בעיקר בטיפולים שלא עברו קיטום ובענפים שהיה לבלוב צעיר בחיקי הגבעולים.
- בטיפולים עם ה- TOG 4 – הייתה נשירה מסיבית כבר מהימים הראשונים, במים לעומת זאת הנשירה הייתה קלה.
 - טיפולי המים והכלור עם קיטום נראים הטובים ביותר עם זאת בתקופת הקיץ העליונה הצעירה נפגעת מוקדם מאוד.
- נראה כי בעונה זו חשוב לקטום את אמירי הענפים וכדאי לטפל בכלור בלבד.