

ג'וֹיָה אַבְגָּא אַוְכָּבָּדָּלָק אַוְכָּעָן

-1998/1999-

שמעון פיבוניה, רבקה אופנברג - מוע"פ ערבה

ט/ז/ט/ז/ט/ז

באביב 1999 נערכה השוואת בין אבטיח רגיל למורכב בחלוקת משק אורגני בעין יהב (משק א/or). חילקת הגידול משמשת זה חמיש שנים יותר לגידול מלוניים במונוקולטורה. החלקה מאולצת מאד בפטריה מונוספורסקוס ובעורמי מחלה נספיס. רמת התממותה של צמחי מלון הגודלים בחלוקת היא בדרך כלל 100% וההתממותה מתרחשת לפני הבשלת הפרי. בדומה למלון, גם האבטיח רגיש לפטריה מונוספורסקוס. השווינו בין שתילי אבטיח רגילים מזן 313 לאבטיחים המורכבים על שתי כנות דלעת מהזינים טזיר וטס אקבותו.

תאריך הניסוי: מועד שתילה - 12/03/99. הנידול במנורות נמוכות.

טיפולים: 1) ביקורת לא מורכב בעומד של 1 מ".

2) כנת טזיר, בעומד של 1 מ".

3) כנת טס אקבותו, בעומד של 1 מ".

4) כנת טס אקבותו בעומד של 1.5 מ".

הוז קריםטון מותך שימש כمفירה. עומד המפירה היה אחד לכל ארבעה מי בכל הטיפולים מחוש לביעות חנתה בטיפול העומד הנמוך. לכל טיפול היו שלוש חזרות. גודל חזרה - 35 מ"ר.

ט/ז/ט/ז/ט/ז

כבר משלבים מוקדמים נראה פיגור גדול בצימוח הוגטטיבי של צמחי הביקורת לעומת הצמחים המורכבים. בהמשך, במהלך مليוי הפרי ולקראת הבשלת הפירות החלה התמוטטות בצמחים הביקורת שהגיעה בתום הניסוי ל-100%. הצמחים המורכבים לא התמוטטו. השדה סבל מביעות מזיקים אשר גרמו כנראה לפגיעה באיכות ובכמות היבול הסופית. נערכו בשדה שלושה קטיפים בין ה-23/05 ל-30/05.

כנה	עומד	משקל פרי לחילקה (ק"ג)	מס' פירות לחילקה (ק"ג)	משקל פרי לzdונם (ק"ג)	גוזל פרי ממוצע (ק"ג)
טס אקבותו	1 מ"	108	22	A 1850*	B 4.8
טס אקבותו	1.5 מ"	134	23	A 2293	A 5.9
טזיר	1 מ"	129	26	A 2214	B 5.0
ביקורת	1 מ"	37	14	B 631	C 2.6

* טיפולים הנבדלים מבחינה סטטיסטית אותיות שונות (מבחן t , p < 0.05).

סיכום

על פי תוצאות ניסיון זה וניסיונות אחרים בעבר ניתן למדוד שכנות הדלעת סבירות לפטריה מונוספורסקוס ונitinן לפחות ככנת אבטיח גם בשטחים המאולחים בפטריה ברמה גבוהה. כנות הדלעת הניל נמצאו בניסויים ותוצאות אחרים מעמידות או סבירות גם גורמי מחלה אחרים, לפיטום ול-SV-MNS. בתכנית בעין תמר אבטיחים לא מרכיבים סבלו מתומות שתילים מפיתיים בשלבי גידול מוקדמים ולאחר מכן מתומות הצמחים הבוגרים שרדזו. הצמחים המרכיבים לעומת זאת שגשגו והעלו יבוליםifs בתנאים אלו. עם כן מלבד העמידיות המוצהרת של כנות הדלעת לפזריות הנבילה הן סבירות גם לשני גורמי מחלות הקרקע העיקריים של אבטיחים באזורה, מונוספורסקוס ווירוס הכתמים הנקרוטיים במלוון (SV-MNS) וגם לפיתויים הגורם לתמותת נבטים ושתיילים צעירים ולעתים גם לתמותת צמחים בוגרים. תכונות הסבירות למחלות של הכנות מתאימות מאד למסק הגידול הארגוני בו אפשרויות חיטוי הקרקע ומחזור הגידולים מוגבלות.

לא נמצא הבדל בין הכנות שנבדקו מבחינת יבול. העומד הנמוך לא הביא להגדלה מובהקת ביבול אך הביא להגדלת גודל הפרי המוצע. אולם לא כדאי להסיק על סמך תוצאות ניסיון זה על העומד הרצוי לגידול. כדי לענות על שאלת העומד הרצוי לצמחים מרכיבים נערכו בשנים האחרונות מספר ניסיונות גדולים בכמה אזורי בארץ ובמועדים שונים.

בניסוי זה התקבלו יבולים נוכיים וחסית. הקדמת מועד השטילה, גידול במנהרה עבירה, דישון מתאים ומוניות נזקי מזיקים עשויים להביא להארכת העונה והגדלת היבול. לעונה הבאה אנו מעוניינים לבדוק גידול אבטיח ננסי. נשווה בין צמחים רגילים למרכיבים מבחינת השפעת ההרכבה על איזות וכמות הפירות ורגישות למחלות קרקע.