

אירועים מעניינים בהגנת הצומח בירקות בערבה, עונת 2016-2017

סיכום עונת ירקות בערבה, תחנת יאיר 25/5/17

סבטלנה דוברינין

מדריכת הגנת הצומח

ממ"ר בכיר מחוזי

שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר



פלפל

- אקרית אדומה – בתחילת העונה
- תנאים מיטביים להתפתחות המזיק
- צמחים קטנים
- חוסר קוטלי אקריות יעילים
- אי יכולת להשתמש באקרית הטורפת עקב תנאים לא מתאימים





רכנף חיוור



סגירת המבנים!



קמחית מנוקדת – פלפל ונוי

- הופעת המזיק בתחילת העונה
- שבירת התכשיר פלש – פיתוח עמידות ע"י המזיק
- קשר בין הנוכחות המזיק בחלקות ובמושב
- **התארגנות של המושבים להכחדת המזיק בנוי**
- פיקוח וסימון מוקדי נגיעות
- בדיקת מוקדי נגיעות עם צוות אחראי
- קבלת החלטות: נוכחות האויבים טבעיים
- מעקב אחר המזיק במהלך העונה








פלפל

- תריפס הפרחים המערבי
- החל להופיע מוקדם מהרגיל
- ריסוסים מוקדמים ללא הצורך – פיתוח עמידות
- הדברה ביולוגית ע"י פשפש האוריוס:
 - קליטת הפשפש - ללא נזק ליבול
 - אי קליטה – נזק כבד לאורך כל העונה
- יצוא לרוסיה – נוכחות המזיק במשלוח עד חודש ינואר







נוכחות התריפס בפרי לאחר הקטיף

מצב הפיטם בפרי	כמות התריפסים, בינוקולאר (ממוצע/פרי)	כמות התריפסים, זכוכית מגדלת	נגיעות בשדה לפי הפיקוח, תריפס/פרח תריפס/פרי	כמות הפירות לבדיקה	תאריך הבדיקה
סגור	-	13	1	76	04/01/17
סגור	-	2	לא נראו	100	10/01/17
פרי אחד פתוח (5)	38 (0.51)	-	1.04	74	19/03/17



עגבניות

- נוכחות הווירוס TBRFV






חיטוי קרקע כאמצעי להתמודדות עם הווירוס

- תצפית בעידן
- נגיעות בעונת 2015-2016
- פיזור ותיחוח:
 - קמח נוצות – 1 קוב/ד'
 - זבל עופות – 1 קוב/ד'
 - זבל מעורבב עופות + בקר – 7 קוב/ד'
- חיטוי סולרי למשך 2,5 חודשים
- ניטור ובדיקת צמחים במהלך העונה – אין צמחים נגועים

אקרית החלודה התפרצות בחודשי האביב





טוטה אבסולוטה

- התפרצות בחודשי האביב
- סגירת המבנים?
- נזק ישיר לפירות





תצילים

- אקרית אדומה – אקרית הטורפת פרסימליס





ציקדות







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!