

סקירה כללית

ירום צבאי - שה"מ - לשכת הדרכה נגב

אזור הערבה הינו בעל פוטנציאל גבוה לגידול עגבניות לשוק המקומי וליריצוא בשטח פתוח ובבתי צמיחה.

גידול העגבניות בשטח פתוח הינו גידול מסורתי בערבה. בהיותו "גידול מכסה", הריקף שטחיו יציב וככל כ - 2100 דונם מהערבה הדרומית ועד כיכר סדום.

בעונה זו הורחב הריקף השטח בז' 5656 ל'ן עירקי על חשבו'ן ה'ן 837. חלה ררידיה בשטחי ה'ן המאוחר "דקלה" 4127. נראה כי ררידיה זו תרמשך בגלל נזקי הקרה החוזרים מידי שנה ל'ן זה.

בענף עגבניות הצ'רי חל השנה גידול של כמעט פי 4 לעומת שנה שעברה. הריקף הגידול הגיע ל - 245 דונם מה'ן ב"ר 124, כמעט כולם בשטח פתוח, אצל 27 מגדלים. על אף פגעי מזג האוויר יוצאו השנה כ - 1000 טון ונפדו מחרירים טובים. נראה כי תמשך מגמת הגידול במוצר זה בעיקר בשטח פתוח וגם בבתי רשת ובתי צמיחה.

בעונת 1991/92 קטן הריקף שטחי הגידול של העגבניות בבתי צמיחה בערבה מ - 243 דונם בעונת 1990/91 ל - 141 דונם, אצל 45 מגדלים.

הסיבות העיקריות לירידיה בהיקף גידול בערבה : הירידיה הנמשכת בתמורה מיריצוא ומספר ימי העבודה הרב, הנדרש לדונם בענף זה.

מקבילה החמות נסגרו העונה ברשות נגד חרקים, לקח מכת הורירום של העונה הקודמת. בכך נחסך שימוש רב בחומרה הדבורה ובימי עבודה.

חדשונם נוסף שהוכנס אצל חלק מהמגדלים: שימוש בדבורי הבר (בומבו) לניעור פרחים והפריה, חדשונם הנראה מבטיח מבחינות התוצאות בשטח ומבחןת החסכו בכח אדם.

(כ-25% רמי העבודה, כ-30 רום לדונם, מוקדשים בד"כ לנרעור תפרחות).
בלט השנה גידול רבוי הזרים הנסironים, אם כי הזרים המוביילים לא השתנו :

<u>הזרים</u>	<u>אחרים *</u>	<u>191</u>	<u>190</u>	<u>175</u>	<u>121</u>	<u>144</u>	<u>אחרוז מהשתח</u>
		10	6	4	9	11	60

* אחרים - 111, 186, 189.

מצג האורור הקשה שפקד בחורף, לא פסח גם על הערבה. טמפרטורות נמוכות מהרגיל, 4 גלי קרה ורמי עננות מרובים, גרמו להאטת הגידול, לדחירות ההבשלה בקטיפי ינואר-פברואר ולפגעי ארכות רבים.
סה"כ שroxko העונה לירצוא מערבה כ - 720 טון עגבניות חמה, במחיר פו"ב של כ - \$1100/טון.

ברור כי לא מוצח פוטנציאל הירצוא של גידול זה אצל המגדלים בערבה השנה.

סיכום המחקרים והנסironות

כמידי שנה, נערכו מבחנים ותცפויות בזרים חדשניים בשטח פתוח בבתי צמיחה, ואחריו זנים פררי טיפול הפקולטה לחקלאות ומנהל המחקר, זנים בעלי פוטנציאל רבול רב ופררי גדול וארכות לירצוא ולשוק המקומי.
עובדות אלו מתוכננות להמשך גם בעונה הבאה.
בעונה זו נמשכה עבודה מטפחי העגבניות במתינות הנסironות בערבה, לבירית זני שטח פתוח העמידים או הסובלנרים לגורמי המחלות רקבול הכתן (פוזזרים קראו-רוט) הנגרמות ע"י פטרית קרגען.

מחלה זו מופיעה ופוגעת מידיו שנה בשתי הగבניות בערבה ובמישור
בכינר-סdom.

לאחרונה דווח על הימצאותה גם באזורי צפון רמת הגולן ע"י
שתי קבוצות רפואיים, נמצאו מכלואים בעלי רמות שונות של עמדות.

הטיפול הנהוג הרום בהכנות השטחים למניעת מהלות קרקע, כמו רקבון הכתור
בגידול הגבניות, הינו חיטוי במלח ברומיד.

במסגרת פרויקט "ערבה נקייה", הצורך והרצון להפחית השימוש בחומר הדבשה,
נבדק בהצלחה ע"י המחלקה לירישום חומרי הדבשה במינהל המחקר החקלאי ומה החלקה
למהלות צמחיים בפקולטה לחקלאות, האפשרות למתן מינון מופחת של ממלח ברומיד
לקרקע, תוך שימוש בפלסטיין משופר וシリוב חיטוי סולרי.