

## תצפית בשרידה בדגיגי באס

אבי קורן - מו"פ נגב - ערבה

בתצפית גידול דגי הבאס ב-1992 נוכחנו ברמות גידול טובות אולם השרידה היתה נמוכה (כ-33%) ונבעה כנראה מקניבליזם בשלבים מוקדמים של האימון. מחיר דגיגי באס גבוה והעלאת השרידה מהוה מרכיב חשוב בהקטנת עלויות הייצור.

בתצפית הנוכחית נקטנו בצעדים להגדלת שרידה:

א. מתן מזון מרוכז באיכות גבוהה בכמה נקודות הזנה ולאורך כל היממה ע"י מאביסים אוטומטיים.

ב. מתן חלק מהמזון בתפזורת על פני כל הבריכה.

ג. שימוש במקומות מסתור לדגים חלשים יחסית.

התצפית נערכה ב-6 מיכלים. כל מיכל הוזן בצורה זהה באיכות כמות ושיטת הפיזור. 3 מהמיכלים הכילו מקומות מסתור. דגיגים במשקל 0.25 גרם הובאו מארה"ב וחולקו בצורה שווה בין המיכלים (1500 דג למיכל, בכל מיכל 6 מ"ק מים).

בתקופת גידול של 5 חודשים הגיעו הדגים לגודל ממוצע 110 גרם. רמת השרידה הממוצעת היתה 60%. רוב הפחת נבע מקניבליזם בתקופת הגידול המוקדמת (חודש חודשיים ראשונים).

לא היה הבדל משמעותי בין הביקורת למיכלים עם מקומות המסתור, מסקנותינו היא שאמון ראשוני של דגיגי באס במיכלים מבוקרים ובהאכלה יעילה יביאו להעלאת שרידה. ניתן לאמן כך עד לגודל 10-20 גרם ולאחר מכן להעביר את הדגים הממוינים לאימון מתקדם בבריכה.

ב-1994 נערך תצפית נוספת לבדיקת רמות שרידה בדגיגי הבאס.